AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

MÉDICO DIARISTA-CLÍNICA MÉDICA 2024/30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) A OMS definiu cuidados paliativos como uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Sobre os cuidados paliativos oferecidos nas unidades de terapia intensiva, assinale a afirmativa correta:

A) O paciente só pode ser informado do seu prognóstico se a família assim o permitir;

B) Podem ser oferecidos a todos os pacientes críticos e os objetivos incluem controle de sintomas, acolhimento familiar e planejamento de final de vida;

C) A sedação paliativa não deve ser oferecida a pacientes que não recebem suporte ventilatório devido ao risco de apneia;

D) Avaliações sobre o prognóstico do paciente não devem ser registradas em prontuário**;**

02) Ventilação não invasiva (VNI) é uma modalidade de dispositivos ventilatórios, desenhada para permitir suporte pressórico sob auxílio de geradores de fluxo/ventiladores a pacientes com distúrbios de mecânica respiratória, sem necessidade de prótese invasiva, como o tubo orotraqueal. A respeito da VNI, analise as afirmativas abaixo:

I- Os dispositivos de VNI geram alto fluxo de ar contínuo, que causa pressurização da via respiratória, desde que exista selamento completo entre a interface e o rosto do paciente;

II- Para realizar VNI podem ser utilizados aparelhos específicos para o método, ou ventiladores mecânicos especiais que permitam essa modalidade além das invasivas. Além de permitir a pressurização da via aérea, esses dispositivos também são capazes de modular a FiO2 dentro do circuito, garantindo também oxigenoterapia suplementar;

III- Os principais modos ventilatórios desenvolvidos para a realização de VNI são o modo de pressão positiva contínua em via aérea ou CPAP (continuous positive airway pressure) e o modo com pressão positiva em dois níveis ou BiPAP (bilevel positive airway pressure).

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e II;

B) Apenas as afirmativas I e III;

C) Apenas as afirmativas II e III;

D) Todas as afirmativas.

03) A insuficiência cardíaca (IC) é a via final de muitas doenças cardiovasculares e se caracteriza pelo bombeamento insuficiente de sangue, ou bombeamento adequado às custas de elevadas pressões de enchimento, resultando em alterações hemodinâmicas como redução do débito cardíaco e/ou elevada pressão de enchimento, em repouso ou aos esforços. Sobre a IC, analise as afirmativas abaixo:

I- Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de IC merecem destaque, e entre eles estão: doença coronariana; hipertensão; diabete; obesidade e tabagismo;
II- Apesar dos avanços no tratamento medicamentoso e nos cuidados multidisciplinares observados nas últimas duas décadas, a IC ainda é uma síndrome clínica associada à alta mortalidade.
III- Peptídeos natriuréticos (BNP e NT-proBNP) são especialmente úteis nos casos de dúvida diagnóstica;
IV- A Fibrilação Atrial é a principal causa de descompensação de IC no Brasil.

Estão corretas:
A) Apenas as afirmativas I e IV;
B) Apenas as afirmativas II, III e IV.
C) Apenas as afirmativas II e III;
D) Apenas as afirmativas I, II e III;

04) Em relação a Taquicardia Ventricular (TV), assinale a afirmativa incorreta:
A)Conceptualmente, a taquicardia ventricular (TV) é definida pela ocorrência de três ou mais batimentos consecutivos com origem nos ventrículos e frequência cardíaca maior que 100 bpm;
B)A TV sustentada é quase sempre sintomática, causando palpitações, sintomas de comprometimento hemodinâmico ou morte súbita cardíaca.
C)A distinção entre TV e Taquicardia supravebtricular é feita por meio do ECG de 12 derivações durante a arritmia.;
E) As TV idiopáticas ocorrem habitualmente em indivíduos idosos, aparentemente normais e são reconhecidas pela ausência de alterações miocárdicas estruturais ao EGC, ecocardiograma, mas com alterações na RM (ressonância magnética).

05) Das opções abaixo assinale aquela que não representa uma contraindicacao absoluta ao uso de fibrinolíticos na Síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento de ST:
A) Lesão ou neoplasia do sistema nervoso central;
B) Idade funcional maior que 60 anos;
C) Dissecção aguda da aorta;
D) Doença terminal;

06) A crise hipertensiva é uma situação clínica comum, caracterizada pelo aumento acentuado e sintomático da pressão arterial, sendo subdividida em emergência e urgência hipertensiva. Em relação as crises hipertensivas, analise as afirmativas abaixo:

I- Urgências hipertensivas: são situações em que o indivíduo apresenta risco iminente de morte ou de lesão definitiva em órgão-alvo, necessitando de intervenção médica imediata e intensiva;

II- Os sintomas mais frequentes em crises hipertensivas são neurológicos (cefaleia, tonturas, déficits neurológicos);

III- Diferentemente das emergências, o tratamento das urgências hipertensivas deve ser iniciado com o objetivo de obter o controle da PA em 24-72 h. O manejo deve ser feito com drogas por via oral, proporcionando redução mais lenta dos níveis pressóricos;

IV- O objetivo de redução da PA nas emergências hipertensivas é de 10-25% nas primeiras 2 horas, com normalização a ser alcançada em 24-48 horas.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e IV;
B) Apenas as afirmativas II, III e IV;
C) Apenas as afirmativas II e III;
D) Apenas as afirmativas I, II e III.

07) Das condutas listadas abaixo, assinale aquela que não está relacionada com melhora nos resultados do tratamento da pancreatite aguda:

A) Antibioticoterapia precoce;
B) Nutrição precoce;
C) Hidratação e reposição volêmica;
D) Suporte ventilatório precoce;

08) Em relação as Ulceras pépticas (UP), analise as afirmativas abaixo:

I- As úlceras pépticas (UP) constituem soluções de continuidade da mucosa gastrintestinal secundárias ao efeito corrosivo do ácido clorídrico (HCl) e da pepsina, estendendo-se através da muscularis mucosae, atingindo a camada submucosa e, mesmo, a muscularis própria;

II- A úlcera gástrica é a forma predominante de doença ulcerosa péptica, sendo cinco vezes mais frequente do que a úlcera duodenal;

III- De modo geral, as UP são mais comuns no sexo masculino;

IV- A doença ulcerosa péptica representa a causa mais comum de hemorragia digestiva alta.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e IV;
B) Apenas as afirmativas II, III e IV;
C) Apenas as afirmativas II e III;
D)Apenas as afirmativas I, II e IV.

09) Em relação às Meningites Agudas, assinale a afirmativa incorreta:

A) As meningites agudas bacterianas, embora menos frequentes que as virais, apresentam maiores morbidade e mortalidade;

B) As etiologias das meningites bacterianas comunitárias mais comuns, em ordem crescente de frequência, são: Streptococcus pneumoniae, o pneumococo; Neisseria meningitidis, o meningococo; e Listeria monocytogenes, a listéria;

C) Antimicrobianos devem ser iniciados, imediatamente, após a coleta do liquor;

D) Deve-se direcionar o antibiótico às bactérias mais prováveis, com base na idade do paciente e em outros fatores do hospedeiro.

10) Paciente sexo feminino, 43 anos, portadora de HIV é internada com historia se crises convulsivas de início recente. Realizou tomografia computadorizada de crânio que mostrou lesões múltiplas no cérebro realçadas por contraste. Qual dos seguintes é o melhor tratamento para a provável doença?

A) Penicilina Benzatina;

B) Aciclovir.

C) Sulfadiazina com pirimetamina;

D) Rifampicina, isoniazida e etambutol;

11) Em relação a Cetoacidose Diabética (CAD), assinale a afirmativa incorreta:

A) Na CAD, dor abdominal é um achado raro e geralmente idiopático, sobretudo em pacientes idosos;

B) A instalação dos sintomas pode ser rápida ou precedida por pródromo de poliúria, polidipsia e polifagia;

C) O rebaixamento do nível de consciência é mais comum no estado hiperglicêmico hiperosmolar;

D) A reposição de bicarbonato raramente é indicada.

12) Em relação a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) , analise as afirmativas abaixo:

I- O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a 90 a 95% de todos os casos de DM;

II- Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genético e ambiental;

III- Trata-se de doença poligênica, com forte herança familiar, ainda não completamente esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais;

IV- O DM2 é bem mais frequente na infância e na adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos, que podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada latent autoimmune diabetes in adults (LADA).

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e IV;

B) Apenas as afirmativas II, III e IV;
C) Apenas as afirmativas II e III;
D) Apenas as afirmativas I, II e III.

13) A respeito das Pneumonias, analise as afirmativas abaixo:

I- A associação clínico-radiológica é o padrão-ouro para diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade (PAC);
II- A pneumonia adquirida na comunidade refere-se à doença adquirida fora do ambiente hospitalar ou de unidades especiais de atenção à saúde ou, ainda, que se manifesta em até 48 horas após a admissão em unidade assistencial;
III- A incidência de pneumonia é maior nos extremos de idade, sendo que os óbitos estão mais concentrados em indivíduos com mais de 60 anos de idade;
IV- Análises hematológicas e bioquímicas: em geral, não estão indicadas para pacientes que farão tratamento ambulatorial, mas têm valor na avaliação inicial e no acompanhamento de pacientes internados.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e IV;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I, II e III;
D) Todas as afirmativas.

14) Sobre o diagnostico por Imagem na fase aguda do Acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), analise as afirmativas abaixo:

I- A TC de crânio sem contraste é indispensável na avaliação de emergência do paciente com AVCI agudo;
II- O uso de contraste não oferece informações adicionais no exame realizado para descartar hipótese de sangramento, exceto se há dúvida a respeito da presença de tumor ou abscesso cerebral;
III- A sensibilidade da TC para o diagnóstico do AVCI agudo não depende do tempo do início dos sintomas;
IV- A TC frequentemente é normal nas primeiras horas após o AVCI. Portanto, na presença de déficit neurológico focal, TC normal reforça o diagnóstico de AVCI.

Estão corretas:

A) Apenas as afirmativas I e IV;
B) Apenas as afirmativas II e III;
C) Apenas as afirmativas I, II e III;
D) Apenas as afirmativas I, II e IV.

15) Em relação ao diagnostico diferencial entre a Insuficiência Renal Aguda (IRA) e a Insuficiência Renal Crônica (IRC), assinale a afirmativa incorreta:

A) Perda de função renal lenta e progressiva, presença de sinais e sintomas de uremia avançada (anemia, coloração amarelo-palha, sintomas neurológicos e digestivos) são sugestivos de IRC;

B) Cilindros largos no sedimento urinário sugerem IRA;

C) Em caso de dúvida persistente, a ultra-sonografia pode mostrar rins contraídos ou hipercogênicos na IRC e rins de aspecto normal ou aumentado na IRA;

D) A nefropatia diabética pode evoluir para IRC com preservação do aspecto renal sonográfico próximo da normalidade.

16) A Colonoscopia é um exame invasivo comum na pratica clinica. Sobre este exame assinale a afirmativa incorreta:

A) A indicação para uma colonoscopia por hemorragia digestiva baixa está totalmente justificada, sobretudo se há suspeita de causa neoplásica;

B) A colonoscopia está indicada nos pacientes com diarreia crônica, principalmente para excluir a colite colágena ou linfocítica, neste caso, as biópsias devem ser realizadas inclusive se a mucosa parecer normal;

C) A utilidade da colonoscopia na doença inflamatória intestinal está na avaliação do comprometimento e gravidade da mesma, já que, a partir deste estudo, serão determinadas as pautas para a terapia médica;

D) A Diverticulite Aguda é uma contraindicação absoluta a realização da colonoscopia.

17) A diarreia é caracterizada pelo aumento do número de evacuações e da diminuição da consistência das fezes, pode ser aguda, crônica, infecciosa e não infecciosa. Considerando as possíveis causas de diarreia, marque a alternativa verdadeira:

A) A causa mais comum de diarreia em crianças tem como causa o Rotavírus, visto que não existe vacina para esse, devido a sua alta taxa mutagênica.

B) A Escherichia coli é uma bactéria natural da mucosa intestinal, portanto, é incapaz de causar diarreia .

C) Higiene inadequada e saneamento básico deficiente não são fatores de risco para a ocorrência de diarreia.

D) A bactéria Shigella pode causar síndrome disentérica, caracterizada por diarreia sanguinolenta com muco e pus.

18) A dengue é uma doença transmitida por vírus, através da picada de mosquitos do gênero Aedes, e o Aedes aegypti é o principal causador da doença. A dengue é comum em muitas partes do mundo, especialmente em áreas tropicais, onde o mosquito é encontrado com maior facilidade. Acerca dessa patologia, marque a opção correta:

A) A transmissão da doença coincide com os períodos de maior intensidade de chuvas, especialmente durante o verão, levando a aumento da densidade dos vetores, quando podem ocorrer surtos de grandes proporções;

www.isgh.org.br
Rua Socorro Gomes,190 - Guajeru
Fortaleza/CE | CEP: 60.843-070
(55-85) 3195.2700

B) No Brasil, há circulação de apenas 02 sorotipos virais, com transmissão já registrada em todos os Estados;
C) A forma hemorrágica da dengue é caracterizada com a presença de dois critérios: sangramento espontâneo ou induzido + plaquetopenia (<100.000 mm3);
D) O tratamento da dengue deve ser feito com Hidroxicloroquina.

19) A respeito da Artrite Reumatoide (AR), assinale a afirmativa incorreta:
A) Em mulheres, manifesta-se na 4ª ou na 5ª década de vida (3:1), enquanto os homens apresentam acometimento mais tardio (6ª a 8ª décadas de vida);
B) Os fatores predisponentes incluem aspectos genéticos (HLA/epítopo compartilhado), hormonais e ambientais (tabagismo e infecções);
C) O risco de desenvolvimento da doença com história familiar positiva pode aumentar 3-5 vezes;
D) Geralmente, as articulações interfalângicas distais são as mais acometidas.

20) É permitido ao profissional médico , segundo o código de ética médica :
A) Usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada;
B) Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria;
C) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência;
D) Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou;

.