

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

AUXILIAR DE FARMÁCIA 2024/61

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) Com relação aos padrões mínimos para farmácia hospitalar e serviços de saúde, é correto o que se afirma em:

- A) A farmácia é responsável somente pelo armazenamento e distribuição de medicamentos, enquanto outros setores como a enfermagem são os responsáveis pela dispensação e controle de estoque;
- B) A prescrição deve ser atendida sempre conforme solicitação do médico, não sendo necessária a avaliação pelo farmacêutico;
- C) O número de farmacêuticos e de auxiliares dependerá das atividades desenvolvidas, da complexidade do cuidado, do número de leitos, do grau de informatização e nível de automação da unidade;
- D) Em hospitais e/ou serviços de saúde onde exista dispensação ambulatorial de medicamentos para pacientes externos, a área destinada para esta finalidade deve ser na mesma área de armazenamento dos medicamentos, desde que o paciente não fique sozinho no setor.

02) Com relação aos sistemas de distribuição de medicamentos, assinale a alternativa incorreta:

- A) A redução dos custos logísticos e uma maior agilidade para tratar uma grande quantidade de pacientes são vantagens do sistema de distribuição coletivo;
- B) Na distribuição por dose unitária, os medicamentos são entregues de forma individualizada, sendo a mais rápida e econômica para os serviços de saúde, uma vez que há pouca participação do farmacêutico e da equipe de auxiliares de farmácia;
- C) O sistema de distribuição escolhido pelo hospital e/ou serviços de saúde deve ser racional, eficiente, econômico, seguro e adequado aos esquemas terapêuticos prescritos;
- D) A unidade que adota o sistema de dose individualizada avia as prescrições para um período de 24h, buscando reduzir os estoques das clínicas e o número de erros relativos aos medicamentos, contudo a enfermagem continua tendo que separar as dosagens para cada paciente.

03) O ciclo logístico dentro da assistência farmacêutica em unidades de saúde envolve um conjunto de atividades coordenadas para garantir que os medicamentos cheguem de forma segura, eficaz e pontual aos pacientes.

Dessa forma, julgue os itens abaixo:

- 1. Na etapa de recebimento ou recepção busca-se principalmente evitar as perdas por validade e garantir a integridade dos medicamentos quanto aos seus aspectos físicos, facilitando o controle de estoque e dispensação.
- 2. Como estratégia para evitar perdas, os medicamentos devem ser organizados de modo que os itens com data de validade mais próxima sejam utilizados primeiro.



3. Na etapa de distribuição, o paciente recebe orientações sobre cuidado e guarda dos medicamentos, bem como a possibilidade de ocorrência de reações adversas, promovendo adesão ao tratamento.

- A) V - V - F
- B) F - V - V
- C) F - V - F
- D) V - F - V

04) Com o objetivo de garantir o armazenamento correto dos medicamentos e/ou de materiais médico hospitalares é correto afirmar que:

- A) A temperatura na área de estoque para produtos termolábeis deve ser mantida em torno de 25°C. Os medicamentos imunobiológicos (como vacinas e soros) devem ser estocados em equipamento frigoríficos semelhantes a saunas;
- B) Os produtos devem ser armazenados sempre em ordem alfabética pelo nome de marca (ou fantasia), em local bem iluminado com a luz solar, evitando contato com pisos e paredes. Como não há orientações do fornecedor, fica a critério da equipe da farmácia a decisão sobre o empilhamento máximo das caixas no ambiente de armazenamento;
- C) Somente o farmacêutico pode acessar a área onde os medicamentos estão armazenados. Além disso, quando há avaria em um dos produtos, este deve ser o primeiro a ser dispensado para evitar perda;
- D) Deve-se manter os medicamentos dispostos na portaria 344/98 armazenados em local seguro e separado dos demais produtos, observando os cuidados quanto à manutenção das suas características físicas, químicas e terapêuticas.

05) Considere que em unidade de saúde a requisição para abastecimento dos medicamentos é calculada a partir da seguinte fórmula:

Cálculo da requisição:

$[(\text{Consumo Médio Semanal} + \text{Estoque de Segurança}) - \text{Estoque Atual do Item}]$

Se o estoque de segurança é sempre de 20% do Consumo Médio Semanal, qual a alternativa verdadeira?

- A) Se o medicamento A tem um consumo médio de 8.000 comprimidos por semana, o estoque de segurança é de 1.600 comprimidos;
- B) Se o medicamento B tem 5.000 comprimidos no estoque atual e o Consumo Médio Semanal é 6000 comprimidos, a requisição será de 1.000 comprimidos;
- C) Se o medicamento C está com o estoque atual zerado, não há possibilidade de cálculo para requisição. Dessa forma, o auxiliar de farmácia ou o farmacêutico pode sugerir uma quantidade com base na experiência dos médicos e enfermeiros;
- D) Se o medicamento D tem um consumo médio de 3.000 comprimidos por semana, o estoque de segurança é de 300 comprimidos. Dessa forma, considerando que o estoque atual é de 3.300 comprimidos, a requisição será igual a 0 (zero).



06) Com relação aos Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP), assinale a alternativa incorreta:

- A) São também chamados de medicamentos de alta vigilância e apresentam risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes quando há falhas na sua utilização;
- B) A talidomida e a isotretinoína, apesar de serem contra-indicados na gestação, não são considerados como MPP para uso ambulatorial, tendo, inclusive, a venda livre de prescrição nas farmácias privadas;
- C) Os erros envolvendo esses medicamentos não são os mais frequentes, porém, quando ocorrem, as consequências tendem a ser mais graves para os pacientes, podendo ocasionar lesões permanentes ou morte;
- D) No uso ambulatorial todos os medicamentos antineoplásicos são considerados como MPP, incluindo os parenterais, as terapias alvo e imunoterapias.

07) É correto o que se afirmar em:

- A) O fracionamento de medicamentos pode ser realizado na área de dispensação, não sendo necessária área específica para tal atividade nos serviços de saúde, desde que haja a solicitação pelo paciente;
- B) O fracionamento de medicamentos é de responsabilidade de qualquer profissional de saúde e busca diminuir os custos dos serviços de saúde com aquisição de medicamentos, desde que não estejam relacionados a ocorrência de intoxicações ou eventos adversos;
- C) Os medicamentos sujeitos ao controle especial de que trata a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações, não podem ser fracionados;
- D) A embalagem dos medicamentos, chamada de primária após fracionamento, deve conter informações sobre o nome do medicamento e o fabricante. Lote e validade não são necessários se essas informações já constarem no sistema que a farmácia utiliza.

08) A seleção da forma farmacêutica ideal é um parâmetro de grande relevância para a qualidade farmacotécnica de um medicamento. Assim, julgue os itens a seguir:

- 1. A forma farmacêutica, apesar de não influenciar na biodisponibilidade, é importante na manipulação e administração dos medicamentos;
 - 2. As suspensões são compostas por uma ou mais substâncias dissolvidas em um determinado solvente ou mistura adequada de solventes miscíveis entre si, não sendo possível empregar princípios ativos insolúveis em veículos mais comuns;
 - 3. Pomadas, cremes, géis, pastas são classificados como formas farmacêuticas sólidas;
 - 4. As cápsulas são formas compostas por um envoltório comestível, que normalmente é à base de gelatina e não devem ser cortadas/partidas.
- A) Todos os itens são verdadeiros;
 - B) Somente um item é verdadeiro;
 - C) Todos os itens são falsos;
 - D) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros.



09) Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| I. Nome do princípio ativo | () Comprimido |
| II. Forma farmacêutica | () Anti-hipertensivo |
| III. Posologia | () Losartana potássica |
| IV. Classe terapêutica | () 50 mg uma vez ao dia |

- A) II - III - I - II;
B) III - I - IV - II;
C) II - IV - I - III;
D) IV - I - III - II.

10) Um paciente deverá tomar 500mg a cada 06 horas por 07 dias do antimicrobiano Cefalexina. Sabendo que cada comprimido contém 250mg de Cefalexina, quantos comprimidos deverão ser prescritos para o tratamento completo?

- A) 56 comprimidos;
B) 28 comprimidos;
C) 14 comprimidos;
D) 42 comprimidos.

11) Na farmácia de uma unidade de saúde, um paciente apresenta a seguinte prescrição:

- 1. Insulina NPH**
- Aplicar 14 UI antes de dormir
- 2. Insulina Regular**
- Aplicar 6 UI antes do café, 8 UI antes do almoço e 4 UI antes do jantar

Considerando que na farmácia há disponibilidade somente da apresentação em caneta e que cada uma possui um total de 300 UI insulina, quantas canetas devem ser dispensadas para garantir 30 dias de tratamento completos?

- A) 01 caneta de insulina NPH e 02 canetas de insulina Regular;
B) 02 caneta de insulina NPH e 01 caneta de insulina Regular;
C) 01 caneta de insulina NPH e 01 caneta de insulina Regular;
D) 02 canetas de insulina NPH e 02 canetas de insulina Regular.

12) Assinale a alternativa correta de acordo com o disposto na RDC 20/2011:

- A) A receita de antimicrobianos tem validade por 30 dias a contar da data de emissão e não tem abrangência nacional;
B) Não há possibilidade de uso contínuo de antimicrobianos;
C) A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto modelo de receita específico;



D) A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos, inclusive os que são sujeitos a controle especial.

13) De acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações, assinale verdadeiro ou falso nas sentenças a seguir:

1. A Notificação de Receita será retida pela farmácia ou drogaria e a receita devolvida ao paciente devidamente carimbada, como comprovante do aviamento ou da dispensação;
2. A Notificação de Receita é sempre exigida no ato da dispensação para todos os pacientes, inclusive para os internados nos estabelecimentos hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou particulares;
3. As Notificações de Receita "A" e "B" são válidas por 30 dias e poderão conter a prescrição no máximo de 5 (cinco) ampolas e para as demais formas farmacêuticas de apresentação, poderá conter a quantidade correspondente no máximo a 30 (trinta) dias de tratamento;
4. Para pacientes em tratamento ambulatorial será exigida a Receita de Controle Especial em 2 (duas) vias e a prescrição poderá conter em cada receita, no máximo 3 (três) substâncias constantes da lista "C1";
5. São exemplos de substâncias sujeitas a Notificação de Receita B (azul): alprazolam, amitriptilina, clonazepam, sertralina e zolpidem.

- A) V - F - F - V - F;
B) V - V - V - F - V;
C) F - V - F - F - V;
D) V - F - V - V - F.

14) De acordo com com RDC 460 de 08 de outubro de 2020 que dispõe sobre Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos, assinale a alternativa incorreta:

- A) A área de recebimento e expedição de medicamentos devem ser separadas entre si;
B) Os números de lote, data de validade e quantidades dos medicamentos devem estar de acordo com as notas fiscais recebidas;
C) O monitoramento e o controle da temperatura durante a armazenagem e o transporte de medicamentos termolábeis é facultativo;
D) As áreas de cantinas ou refeitórios, quando existentes, e de vestiários, sanitários e lavatórios não devem ter comunicação direta com as áreas de armazenagem.

15) A RDC 306/2004 que dispõe sobre Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde é fundamental para proteger a saúde pública e o meio ambiente, evitando a contaminação por agentes infecciosos, químicos e radioativos. De acordo com essa resolução é correto o que se afirma em:

- A) A etapa de manejo consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos;



- B) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante;
- C) Os resíduos perfurocortantes são identificados como Grupo C, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos;
- D) Pacientes e públicos em geral não estão autorizados a consultar o PGRSS. Assim, devem ser mantidas cópias do PGRSS somente para consulta da autoridade sanitária ou ambiental competente.

16) Os corticóides, também conhecidos como corticoesteróides, são medicamentos de ação anti-inflamatória e imunossupressora, contudo seu uso prolongado pode trazer vários efeitos indesejáveis, entre eles a ocorrência de hipertensão e aumento dos níveis de glicose no sangue. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de corticóide, um anti-hipertensivo e um hipoglicemiante oral:

- A) Nimesulida, Anlodipino e Metformina;
- B) Beclometasona, Carvedilol e Insulina;
- C) Ibuprofeno, Sinvastatina e Gliclazida;
- D) Prednisona, Enalapril e Glibenclamida.

17) O medicamento paracetamol 100 mg/mL foi prescrito a uma criança, na posologia de 3,0 mL, de 8 em 8 horas, durante 5 (cinco) dias. Considerando que o frasco disponível na farmácia contém 30 ml de volume final do medicamento, assinale a alternativa que apresenta o número de frascos necessários para o tratamento completo e a quantidade total em “g” (gramas) de paracetamol usada pelo paciente ao final do tratamento, respectivamente:

- A) 02 frascos e 4,5 g (gramas) de paracetamol;
- B) 01 frasco e 3,0 g (gramas) de paracetamol;
- C) 02 frascos e 450 g (gramas) de paracetamol;
- D) 01 frasco e 45 g (gramas) de paracetamol.

18) Com relação aos materiais médicos hospitalares, é incorreto o que se afirma em:

- A) As agulhas hipodérmicas podem ser usadas para vacinação. Quanto maior o número do calibre, menor será o diâmetro da agulha;
- B) A sonda uretral é um pequeno tubo que é inserido na uretra para esvaziar a bexiga, sendo um recurso importante para pessoas com lesão medular que não conseguem controlar a urina;
- C) As luvas de procedimentos são de uso único e devem ser descartadas após o uso para evitar a transmissão de patógenos e garantir a segurança do paciente e do profissional de saúde;
- D) As lancetas usadas para monitoramento da glicose capilar podem ser reutilizadas desde que sejam esterilizadas após cada uso e as fitas reagentes devem ser mantidas fora de suas embalagens originais para prolongar sua eficácia.



19) Sobre biossegurança é incorreto o que se afirma em:

- A) O uso de EPIs adequados, como luvas, aventais, máscaras e óculos de proteção, deve ser feito sempre que houver risco de exposição a substâncias potencialmente perigosas;
- B) A esterilização corresponde ao processo destruição da maior parte dos microrganismos patógenos, exceto esporulados, sendo adequada para ambientes onde a eliminação total não é necessária;
- C) Chuveiro de emergência e lava-olhos são exemplos de equipamentos de proteção coletiva (EPC);
- D) A correta Higienização de Mãos em serviços de saúde tem sido foco de especial atenção para a prevenção da disseminação de micro-organismos.

20) Assinale a alternativa correta:

- A) Os medicamentos homeopáticos são aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais;
- B) Princípio ativo é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;
- C) As vias subcutânea, intramuscular, endovenosa e intradérmica são classificadas como vias enterais;
- D) Um fármaco com índice terapêutico baixo tem estreita margem de segurança, uma vez que a dose terapêutica é próxima da dose tóxica.