



PROCESSO SELETIVO MAQUEIRO 2025/188
AVALIAÇÃO ESPECIFICA

1. A higiene das mãos deve ser realizada preferencialmente com preparação alcoólica nas situações:

- a) Quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
- b) Antes de colocar luvas estéreis.
- c) Antes e após tocar o paciente, quando não houver sujidade visível.
- d) Após contato com superfícies limpas.

2. Segundo as recomendações de prevenção de IRAS, qual é o tempo recomendado para fricção com preparação alcoólica?

- a) 5 segundos
- b) 10 segundos
- c) 20 a 30 segundos
- d) 60 segundos

3. Uma das “Oportunidades dos 5 Momentos para Higienização das Mãos” é:

- a) Antes de tocar superfícies inanimadas.
- b) Antes do cuidado ao ambiente do paciente.
- c) Após administrar medicamentos orais.
- d) Antes do contato com o paciente.

4. A higiene das mãos com água e sabão é obrigatória:

- a) Antes de calçar luvas de procedimento.
- b) Após retirar os EPIs, independentemente da situação.
- c) Sempre que houver sujidade visível ou contato com fluidos corporais.
- d) Antes de trocar a roupa de cama do paciente.

5. Sobre a técnica correta de higienização das mãos com preparação alcoólica, é CORRETO afirmar:

- a) Não é necessário friccionar a ponta dos dedos.
- b) A técnica dispensa a secagem natural.
- c) É necessário friccionar todas as superfícies das mãos até secar.
- d) Deve-se enxaguar com água após o uso.

6. A NR-32 visa:

- a) Regular o uso de medicamentos de alto risco.
- b) Estabelecer diretrizes para proteção dos trabalhadores da saúde.
- c) Estabelecer normas de conduta para pacientes internados.
- d) Regulamentar apenas serviços ambulatoriais.

7. São consideradas medidas básicas da NR-32:

- a) Uso obrigatório de jaleco dentro e fora da instituição.
- b) Proibição do uso de água sanitária no ambiente hospitalar.
- c) Capacitação permanente dos trabalhadores sobre riscos ambientais.
- d) Adoção de turno contínuo sem pausas.



8. Em relação à exposição ocupacional a material biológico, a NR-32 determina que:

- a) O trabalhador deve pagar pelos EPIs danificados.
- b) O empregador deve fornecer EPIs adequados, sem ônus ao trabalhador.
- c) Luvas substituem a necessidade de vacinação.
- d) Cabe ao trabalhador supervisionar as condutas pós-exposição.

9. Sobre o transporte interno de materiais biológicos:

- a) Pode ser feito em recipientes abertos para rápida visualização.
- b) Deve ser feito em recipientes rígidos, identificados e estanques.
- c) Deve ser realizado somente por pessoal administrativo.
- d) Pode ser feito em sacolas de uso comum.

10. A vacinação obrigatória recomendada pela NR-32 inclui:

- a) Influenza e malária.
- b) Hepatite B e tétano.
- c) Dengue e febre amarela para todos.
- d) Sarampo e varicela apenas.

11. A RDC 222/2018 define o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde como:

- a) Conjunto de ações apenas para descarte final.
- b) Ações que abrangem segregação, acondicionamento, coleta e destinação final.
- c) Ações executadas apenas pelo setor de limpeza.
- d) Processo limitado à coleta interna.

12. Resíduos do Grupo A (potencialmente infectantes) incluem:

- a) Restos alimentares.
- b) Materiais perfurantes sem contaminação.
- c) Sangue e fluidos corpóreos.
- d) Medicações vencidas.

13. Materiais perfurocortantes devem ser descartados:

- a) Em sacos brancos leitosos.
- b) Em recipientes rígidos, resistentes e com tampa.
- c) Em caixas de papelão comum.
- d) Em sacolas pretas de resíduos comuns.

14. A cor recomendada para o saco de resíduos infectantes (Grupo A) é:

- a) Azul
- b) Verde
- c) Branco leitoso
- d) Preto

15. No plano de gerenciamento de resíduos (PGRSS), o responsável técnico deve:

- a) Ser obrigatoriamente um engenheiro clínico.
- b) Elaborar e implementar rotinas de manejo de resíduos.



- c) Atuar apenas como consultor externo.
- d) Manter o documento confidencial sem acesso dos trabalhadores.

16. Ao atender uma vítima de parada cardiorrespiratória, o primeiro passo é:

- a) Iniciar compressões torácicas.
- b) Verificar responsividade e segurança da cena.
- c) Procurar um desfibrilador imediatamente.
- d) Realizar respiração boca a boca.

17. Em caso de sangramento intenso, a conduta inicial recomendada é:

- a) Lavar o ferimento com sabão antes de conter o sangramento.
- b) Aplicar pressão direta sobre o local.
- c) Elevar a cabeça da vítima.
- d) Mobilizar o membro afetado.

18. A posição lateral de segurança é indicada para:

- a) Vítimas com fratura exposta.
- b) Vítimas inconscientes com respiração preservada.
- c) Vítimas conscientes com dor torácica.
- d) Vítimas em parada cardiorrespiratória.

19. Em caso de queimaduras térmicas, recomenda-se:

- a) Romper bolhas para aliviar a dor.
- b) Aplicar pasta de dente ou manteiga.
- c) Resfriar com água corrente por 10 a 20 minutos.
- d) Cobrir com algodão embebido em álcool.

20. Para vítimas de engasgo consciente, o procedimento recomendado é:

- a) Realizar compressões torácicas imediatamente.
- b) Dar água para facilitar a deglutição.
- c) Aplicar a manobra de Heimlich.
- d) Fazer massagem abdominal com a vítima deitada.