



AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

MAQUEIRO 2025 | 243

1. A humanização na assistência à saúde tem como principal objetivo:

- A) Reduzir o tempo de permanência do paciente na unidade.
- B) Garantir atendimento técnico, sem envolvimento emocional.
- C) Promover acolhimento, respeito e dignidade ao paciente.
- D) Priorizar exclusivamente a produtividade do serviço.

2. Durante o transporte do paciente, uma atitude compatível com a humanização é:

- A) Realizar o transporte em silêncio absoluto.
- B) Informar o paciente sobre o procedimento e ouvi-lo.
- C) Evitar contato visual para agilizar o serviço.
- D) Manter comunicação apenas com a equipe.

3. Antes de realizar a transferência do paciente da maca para o leito, o maqueiro deve:

- A) Retirar as grades da maca sem avisar.
- B) Ajustar a altura da maca ao leito e travar os freios.
- C) Solicitar que o paciente se movimente sozinho.
- D) Desligar equipamentos sem autorização.

4. Uma prática correta durante a movimentação do paciente é:

- A) Flexionar a coluna e manter as pernas estendidas.
- B) Manter a coluna ereta e utilizar a força das pernas.
- C) Realizar movimentos bruscos para maior rapidez.
- D) Transportar o paciente sem apoio da equipe.

5. Antes da transferência do paciente da cadeira de rodas para o leito, é correto:

- A) Manter os freios destravados.
- B) Posicionar a cadeira distante do leito.
- C) Travar os freios da cadeira de rodas.
- D) Realizar a transferência sem comunicação.

6. A mobilização periódica do paciente acamado tem como objetivo principal:

- A) Reduzir custos hospitalares.
- B) Prevenir úlceras por pressão e complicações.
- C) Facilitar apenas a limpeza do leito.
- D) Evitar o contato com a equipe.

7. Durante o transporte interno do paciente, é responsabilidade do maqueiro:

- A) Administrar medicamentos.
- B) Observar condições gerais e comunicar intercorrências.



- C) Alterar prescrições médicas.
- D) Decidir sobre alta hospitalar.

8. Um bom relacionamento interpessoal no ambiente hospitalar exige:

- A) Comunicação agressiva e direta.
- B) Postura ética, respeito e trabalho em equipe.
- C) Isolamento profissional.
- D) Autoritarismo no trato com pacientes.

9. Ao lidar com familiares de pacientes, o maqueiro deve:

- A) Fornecer diagnósticos médicos.
- B) Manter postura respeitosa e encaminhar dúvidas à equipe.
- C) Ignorar questionamentos.
- D) Divulgar informações sigilosas.

10. É uma conduta ética do maqueiro:

- A) Divulgar informações do paciente para colegas.
- B) Respeitar o sigilo das informações.
- C) Fotografar pacientes sem autorização.
- D) Comentar casos clínicos em locais públicos.

11. A lavagem das mãos é considerada:

- A) Um procedimento opcional.
- B) A principal medida de prevenção de infecções.
- C) Necessária apenas após contato com sangue.
- D) Exclusiva da equipe de enfermagem.

12. A higienização das mãos deve ser realizada:

- A) Apenas ao final do plantão.
- B) Antes e após contato com o paciente.
- C) Somente quando visivelmente sujas.
- D) Apenas após uso de luvas.

13. Os EPIs têm como finalidade:

- A) Substituir a higienização das mãos.
- B) Proteger o profissional e o paciente.
- C) Evitar o contato entre profissionais.
- D) Ser utilizados apenas em isolamento.

14. É exemplo de EPI utilizado pelo maqueiro:



- A) Estetoscópio.
- B) Luvas e máscara.
- C) Prontuário médico.
- D) Termômetro.

15. Caracteriza uma situação de emergência:

- A) Condição estável com risco futuro.
- B) Situação sem risco imediato.
- C) Risco iminente de morte.
- D) Atendimento agendado.

16. A urgência se diferencia da emergência porque:

- A) Não necessita atendimento.
- B) Pode aguardar atendimento sem risco.
- C) Exige atendimento rápido, mas sem risco imediato de morte.
- D) Nunca ocorre em ambiente hospitalar.

17. A transmissão de infecções por contato ocorre principalmente por:

- A) Ar-condicionado.
- B) Superfícies e mãos contaminadas.
- C) Picadas de insetos.
- D) Gotículas respiratórias.

18. É exemplo de transmissão por gotículas:

- A) Tuberculose.
- B) Sarampo.
- C) Gripe.
- D) Hepatite B.

19. A transmissão sanguínea pode ocorrer por:

- A) Aperto de mãos.
- B) Uso de material perfurocortante contaminado.
- C) Espirros.
- D) Contato com roupas limpas.

20. A posição decúbito dorsal corresponde a:

- A) Paciente deitado de lado.
- B) Paciente deitado de barriga para baixo.
- C) Paciente deitado de costas para o leito.
- D) Paciente sentado.